

代謝性強心剤

# アデリール錠5 アデリール錠10

ADELIR Tab. 5・10  
(ユビデカレノン錠)

	錠5	錠10
承認番号	15400AMZ00928	15400AMZ00929
薬価収載	2010年11月	1981年9月
販売開始	2010年11月	2001年10月
再評価結果	1988年1月	

貯法：遮光、室温(1~30℃)保存  
 (ユビデカレノンの融点(約48℃)  
 以上になると、まだら変色を起  
 こすことがある)  
 使用期限：容器に表示の使用期限内  
 に使用すること

## 【組成・性状】

### アデリール錠5

成分・含量 (1錠中)	日本薬局方 ユビデカレノン5mg含有					
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、バレイショデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム					
外形			直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)	色調 剤形
表面	裏面	側面				
			5.5	2.9	70	黄色～ だいたい 黄色 素錠
						識別 コード TKS 115

### アデリール錠10

成分・含量 (1錠中)	日本薬局方 ユビデカレノン10mg含有					
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、バレイショデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム					
外形			直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)	色調 剤形
表面	裏面	側面				
			6.0	3.5	100	黄色～ だいたい 黄色 割線入り 素錠
						識別 コード TKS 117

## 【効能・効果】

基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状

## 【用法・用量】

ユビデカレノンとして通常成人は1回10mg(5mg錠：2錠、10mg錠：1錠)を1日3回食後に経口投与する。

## 【使用上の注意】

### 1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
1) 消化器	胃部不快感、食欲減退、吐気、下痢
2) 過敏症 <sup>注)</sup>	発疹

注)このような症状があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 2. 適用上の注意

薬剤交付時 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

## ※【薬効薬理】

ミトコンドリアの電子伝達系におけるコハク酸脱水素酵素の補酵素(補酵素Q<sub>10</sub>)である。心疾患時の低下を補うことにより、虚血下の酸素利用効率の改善や低下したATP合成能の改善が示唆されている<sup>1)</sup>。

## 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：〔日局〕ユビデカレノン(Ubidecarenone)

化学名：(2E, 6E, 10E, 14E, 18E, 22E, 26E, 30E, 34E, 38E)-2-(3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39-Decamethyltetraconta-2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38-decaen-1-yl)-5, 6-dimethoxy-3-methyl-1, 4-benzoquinone

分子式：C<sub>59</sub>H<sub>90</sub>O<sub>4</sub>

分子量：863.34

構造式：



性状：本品は黄色～だいたい色の結晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品はジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくく、水にほとんど溶けない。

本品は光によって徐々に分解し、着色が強くなる。

融点：約48℃

## 【取扱い上の注意】

### 安定性試験

最終包装製品を用いて加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)を実施した結果、アデリール錠5は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された<sup>2)</sup>。

最終包装製品を用いて長期保存試験(室温、5年間)を実施した結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、アデリール錠10は通常の市場流通下において5年間安定であることが確認された<sup>3)</sup>。

## 【包装】

アデリール錠5 PTP 100錠(10錠×10)

アデリール錠10 PTP 100錠(10錠×10) 1000錠(10錠×100)

## ※【主要文献】

※1)第十六改正日本薬局方解説書 C-5022、廣川書店

※2)ナガセ医薬品(株)：アデリール錠5の安定性試験(NM0250)

※3)ナガセ医薬品(株)：アデリール錠10の長期保存試験(NM0194)

※※【製品に関するお問い合わせ先】

「主要文献」に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

ファイザー株式会社 製品情報センター  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7  
学術情報ダイヤル 0120-664-467  
FAX 03-3379-3053

®登録商標

製造販売元  
**トクセ医薬品株式会社**  
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

※※販売  
**ファイザー株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-22-7

※※提携  
**マイラン製薬株式会社**  
大阪市中央区本町2丁目6番8号